

## Recommandations pour les VVC, PAC, picline : Leur pansement et leur utilisation

### Antiseptique

- Utiliser Biseptine (3 ou 4 temps?) ou chloraprep.

### Rinçage

- Utiliser une seringue de 20 cc et rincer en 3 pressions. Faire au moins un rinçage par semaine.

### PAC

- Changement d'aiguille tous les 7 jours sauf en soins palliatifs tous les 15 jours.

### Habillage

- Masque et gants stériles pour pansement, manipulation cathéter, pose ou changement d'aiguille
- Juste masque pour manipulation du pompon à distance du cathéter.

### Manipulation

- Au niveau du cathéter ou de l'aiguille de PAC, la manipulation se fait en stérile.
- Au niveau du pompon à distance du cathéter, pas en stérile, avec des compresses propres.
- Mettre les robinets sur tubulures dans des compresses sèches avec coheban propre autour.
- Manipulation des robinets avec compresses inhibées d'ATS.
- Lors des Bilans sanguins utiliser des gants non stériles avec des compresses propres.

### Fixation

- Soit avec un filet pour les plus petits enfants
- Soit une épingle à nourrice sécurisée accrochée au tee shirt pour les plus grands enfants.

### Fréquence du pansement

- Une fois par semaine sauf s'il n'est plus occlusif. Si c'est un cathéter nutricath et qu'il n'est pas utilisé : possibilité de le fermer avec un bouchon et de fermer complètement le pansement.

### Type de pansement

- 1/ IV 3000
- 2/ tegaderm
- 3/ mepilex